
生活習慣改善
に向けた保健指導
不健康な生活習慣
高血圧
肥満
脂質異常症
高血糖
降圧剤
血圧低下
脳組織への血液循環低下
脳主幹動脈の粥状硬化
血管内の血栓形成
脳血管閉塞
脳毛細血管（穿通枝）壁の肥厚
抗凝固薬
抗血小板薬
脳血栓症
血栓剥離
脳の虚血
毛細血管の閉塞
（ラクナ梗塞）
血圧維持
心疾患
（弁膜症・心房細動）
心臓内血栓形成
脳血管閉塞
脳塞栓症
抗凝固薬抗
血小板薬
抗凝固薬
抗血小板薬
TIA
（一過性脳虚血発作）
可逆的
（一時的）
不可逆的
（恒久的）
脳細胞の壊死
脳梗塞
二酸化炭素蓄積
血管拡張
脳浮腫
抗脳浮腫薬
昇圧剤、補液
血行力学的梗塞
脳保護薬
フリーラジカル
の発生
脳細胞を傷害
脳梗塞部位の
機能障害
転倒
歩行障害
失禁
尿閉
頻尿
ADL 低下
活動量減少
排尿障害
手の
巧緻性低下
身体可動性低下
関節拘縮
作業療法
麻　痺
理学療法
感覚機能障害
運動機能障害
構音障害
大脳機能の障害
運動性失語障害
感覚性失語障害
言語機能障害
言語訓練
死
心肺停止
脳幹部機能障害
脳幹部圧迫
梗塞部・周辺部
の体積の増加
頭蓋内圧亢進
脳ヘルニア
減圧開頭術
（頭蓋内圧亢進症状）
頭痛、嘔気・嘔吐、意識障害、
麻痺等の出現・増悪、
クッシング現象、
視力障害（うっ血乳頭）
（脳ヘルニア症状）
対光反射消失、
意識消失、呼吸停止
（凡例）
治　療
看　護
矢印が色分けされているのは矢印同士の重なりを区別するためですので、『同じもの』と考えてください。